

Fld. sind sehr deutlich nach hinten verschmälert, deutlich (aber schwächer als bei *viator*) punktirt-gestreift, die äußeren Streifen nur wenig stärker als die nach der Naht zu gebogenen; die Fld. sind oben an der Spitze gleichsam eingeknickt, jede einzelne ist innen an der Spitze schräg abgestutzt. Das Abdomen ist in der Mitte sehr fein und weitläufig punktirt, an den Seiten ein wenig stärker; die Beine sind noch schlanker und zarter als bei *Doubledaya*, die Tarsen bei dem einzigen, mir vorliegenden Ex. ähnlich erweitert wie bei dem ♀ von *Doubledaya*, beim ♂ wahrscheinlich stärker.

Der Umstand, daß der Bau der Fld.-Spitze ein anderer ist als bei *Doubledaya*, daß das Halsschild an der Basis keine eingedrückten Linien zeigt und daß die Fühlerkeule nur dreigliedrig, nicht viergliedrig ist und daß die Fld. an der Spitze ausgeschnitten sind, bietet genügende Gründe, die neue Art als Gattung der *Doubledaya* gegenüber zu stellen; dieselbe würde in der von Gorham gegebenen Liste der *Languria*-Arten (Proceed. of the Zool. Soc. of London 1887, p. 361) hinter *Doubledaya* einzuschalten sein:

†††† Apex of elytra utrinque oblique truncatus, antennarum
clava triarticulata: *Cosmolanguria* Krtz.

Cetoniden vom Nyassa-See

in der Sammlung des Hrn. Dr. Veth in Rotterdam.

Hr. Dr. Veth sandte mir folgende, am Nyassa-See gesammelte Cetoniden zu:

1. *Eudicella Gralli* Buquet. — Ein ♂.
2. *Eudicella Gralli* var. *interruptefasciata* Kraatz. Die Randbinde ist bei diesem Ex. vollständig, die Dorsalbinde weit vor der Mitte unterbrochen; hinter der Mitte zweigt sich außen von der Dorsalbinde eine schmale Binde ab, die einige Millimeter nach hinten verläuft. Spuren dieser Binde finden sich auch bei *Gralli* von anderen Localitäten und bei *Oberthüri* ♂ und ♀. — Ein Ex.
3. *Trymodera Duvivieri* Schoch. — Einige Ex.
4. *Dinonota Vethi* Kraatz wird später in dieser Zeitschrift beschrieben. — Einige Ex.
5. *Xeloma odiosa* Gory. — Ovumbo. — Ein Ex.
6. *Leucocelis cupricollis* Krtz. 1860. — Einige Ex.
7. *Leucocelis ruficauda* Lansb. — Einige Ex.
8. *Leucocelis rubriceps* Raffray. — Einige Ex.
9. *Pseudoprotætia stictica* Krtz. — Ovumbo. — Ein Ex.
10. *Spilophorus plagosus* Bohem. — Einige Ex.
11. *Cymophorus confusus* Kraatz. — Einige Ex.

Dr. G. Kraatz.